

## I. DISPOSICIONS GENERALS

### MINISTERI D'AGRICULTURA I PESCA, ALIMENTACIÓ I MEDI AMBIENT

**10928** *Ordre APM/902/2017, de 22 de setembre, per la qual es modifica el Reglament tècnic de control i certificació de llavors de plantes farratgeres, aprovat per l'Ordre ARM/3370/2010, de 27 de desembre.*

El Reglament tècnic de control i certificació de llavors de plantes farratgeres, aprovat per l'Ordre ARM/3370/2010, de 27 de desembre, estableix els requisits que s'han de complir en el procés de producció de les llavors de plantes farratgeres, d'acord amb el que estableix la Directiva 66/401/CEE del Consell, de 14 de juny de 1966, relativa a la comercialització de les llavors de plantes farratgeres.

La Directiva 66/401/CEE del Consell ha estat modificada per la Directiva d'execució (UE) 2016/2109 de la Comissió, d'1 de desembre de 2016, per la qual es modifica la Directiva 66/401/CEE del Consell, pel que fa a la inclusió de noves espècies i al nom botànic de l'espècie *Lolium x boucheanum* Kunth.

Mitjançant la Decisió 2009/109/CE de la Comissió es va establir l'organització d'un experiment temporal per valorar si certes espècies que no preveu la Directiva 66/401/CEE es poden comercialitzar com a mesclades de llavors o en mesclades de llavors. L'experiència adquirida durant aquest experiment temporal mostra que les espècies *Biserrula pelecinus*, *Lathyrus cicera*, *Medicago doliata*, *Medicago italica*, *Medicago littoralis*, *Medicago murex*, *Medicago polymorpha*, *Medicago rugosa*, *Medicago scutellata*, *Medicago truncatula*, *Ornithopus compressus*, *Ornithopus sativus*, *Plantago lanceolata*, *Trifolium fragiferum*, *Trifolium glanduliferum*, *Trifolium hirtum*, *Trifolium isthmocarpum*, *Trifolium michelianum*, *Trifolium squarrosum*, *Trifolium subterraneum*, *Trifolium vesiculosum* i *Vicia benghalensis* contribueixen a la creació de noves mesclades de llavors de plantes farratgeres que ofereixen solucions per a pastures i farratges duradors, productius i diversos des del punt de vista biològic. Aquestes espècies, per tant, s'han d'incorporar a la llista d'espècies que preveu l'article 2 de la Directiva 66/401/CEE.

A l'article 2 de la Directiva 66/401/CEE apareix *Lolium x boucheanum* Kunth. L'Associació Internacional d'Anàlisi de Llavors ha canviat recentment la denominació botànica de *Lolium x boucheanum* Kunth a *Lolium x hybridum* Hausskn.

La present norma incorpora a l'ordenament jurídic intern la Directiva d'execució (UE) 2016/2109 de la Comissió, d'1 de desembre de 2016, a través de la modificació corresponent del Reglament tècnic de control i certificació de llavors de plantes farratgeres.

En l'elaboració d'aquesta disposició s'han consultat les comunitats autònomes i les entitats representatives dels sectors afectats.

En virtut d'això, d'acord amb el Consell d'Estat, dispenso:

**Article únic.** *Modificació del Reglament tècnic de control i certificació de llavors de plantes farratgeres, aprovat per l'Ordre ARM/3370/2010, de 27 de desembre.*

Es modifica el Reglament tècnic de control i certificació de llavors de plantes farratgeres, aprovat per l'Ordre ARM/3370/2010, de 27 de desembre, en els termes següents:

U. A l'annex «Reglament tècnic de control i certificació de llavors i plantes farratgeres», l'apartat I. Espècies subjectes al Reglament tècnic, l'article I.1 sobre àmbit d'aplicació d'aquest Reglament tècnic, queda modificat de la manera següent:

«a) A la lletra a) Poaceae (Gramineae), la denominació "*Lolium x boucheanum* Kunth" se substitueix per la denominació "*Lolium x hybridum* Hausskn".

b) La lletra b) Fabaceae (Leguminosae) se substitueix pel text següent:

"b) Fabaceae (Leguminosae)	Lleguminoses
<i>Biserrula pelecinus</i> L. . . . .	Bissèrrula.
<i>Galega orientalis</i> Lam. . . . .	Galega farratgera.
<i>Hedysarum coronarium</i> L. . . . .	Enclòver.
<i>Lathyrus cicera</i> L. . . . .	Guixó.
<i>Lathyrus sativus</i> L. . . . .	Guixes, guixeres.
<i>Lotus corniculatus</i> L. . . . .	Lot corniculat.
<i>Lupinus albus</i> L. . . . .	Llobí, tramús.
<i>Lupinus angustifolius</i> L. . . . .	Llobí blau.
<i>Lupinus luteus</i> L. . . . .	Llobí groc.
<i>Medicago doliata</i> Carmign. . . . .	Melgó.
<i>Medicago italica</i> (Mill.) Fiori . . . . .	Medicago italica.
<i>Medicago littoralis</i> Rohde ex Loisel. . . . .	Medicago littoralis.
<i>Medicago lupulina</i> L. . . . .	Melgó menut.
<i>Medicago murex</i> Willd. . . . .	Trèvol de rodet.
<i>Medicago polymorpha</i> L. . . . .	Melgó de llapassa; trèvol femella.
<i>Medicago rugosa</i> Desr. . . . .	Trèvol de rodet.
<i>Medicago sativa</i> L. . . . .	Alfals.
<i>Medicago scutellata</i> (L.) Mill. . . . .	Melgó de botons.
<i>Medicago truncatula</i> Gaertn. . . . .	Melgó truncat.
<i>Medicago</i> × <i>varia</i> T. Martyn Sand. . . . .	Alfals d'arena.
<i>Onobrychis viciifolia</i> Scop. . . . .	Trepadella
<i>Ornithopus compressus</i> L. . . . .	Ungla de canari.
<i>Ornithopus sativus</i> Brot. . . . .	Serradella.
<i>Pisum sativum</i> L. (partim). . . . .	Pèsol farratger.
<i>Trifolium alexandrinum</i> L. . . . .	Bersim.
<i>Trifolium fragiferum</i> L. . . . .	Trèvol maduixer.
<i>Trifolium glanduliferum</i> Boiss. . . . .	Trifolium glanduliferum.
<i>Trifolium hirtum</i> All. . . . .	Trèvol pelut.
<i>Trifolium hybridum</i> L. . . . .	Trèvol híbrid.
<i>Trifolium incarnatum</i> L. . . . .	Fenc.
<i>Trifolium isthmocarpum</i> Brot. . . . .	Trifolium isthmocarpum.
<i>Trifolium michelianum</i> Savi. . . . .	Trifolium michelianum.
<i>Trifolium pratense</i> L. . . . .	Trèvol de prat.
<i>Trifolium repens</i> L. . . . .	Trèvol repent.
<i>Trifolium resupinatum</i> L. . . . .	Trèvol persa.
<i>Trifolium squarrosum</i> L. . . . .	Trifolium squarrosum.
<i>Trifolium subterraneum</i> L. . . . .	Trèvol subterrani.
<i>Trifolium vesiculosum</i> Savi. . . . .	Trèvol vesiculós.
<i>Trigonella foenum-graecum</i> L. . . . .	Fenigrec.
<i>Vicia benghalensis</i> L. . . . .	Garlanda atropurpúria.
<i>Vicia ervilia</i> (L.) Willd. . . . .	Erb.
<i>Vicia faba</i> L. (partim) . . . . .	Favera.
<i>Vicia monanthos</i> L. Desf. . . . .	Garrofa.
<i>Vicia pannonica</i> Crantz. . . . .	Veça pannonica.
<i>Vicia sativa</i> L. . . . .	Veça comuna.
<i>Vicia villosa</i> Roth . . . . .	Veça."

c) A la lletra c) Altres espècies, s'introdueix l'entrada següent:

" <i>Plantago lanceolata</i> L.	Plantatge de fulla estreta".»
---------------------------------	-------------------------------

Dos. A l'annex «Reglament tècnic de control i certificació de llavors i plantes farratgeres», l'apartat II. Categoria de llavors, a l'article II.2 sobre Espècies per a les quals s'admet únicament la producció de llavor de base i certificada, al punt a) Poaceae (Gramineae) la denominació «*Lolium x boucheanum* Kunth» se substitueix per la denominació «*Lolium x hybridum* Hausskn».

Tres. L'annex I «Requisits de les llavors» i l'annex II «Pesos dels lots i de les mostres» queden modificats tal com estableix l'annex d'aquesta Ordre.

Disposició final primera. *Incorporació de dret de la Unió Europea.*

Mitjançant aquesta Ordre s'incorpora al dret espanyol la Directiva d'execució (UE) 2016/2109 de la Comissió, d'1 de desembre de 2016, per la qual es modifica la Directiva 66/401/CEE del Consell, relativa a la comercialització de plantes farratgeres.

Disposició final segona. *Entrada en vigor.*

Aquesta Ordre entra en vigor l'1 de gener de 2018.

Madrid, 22 de setembre de 2017.—La ministra d'Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient, Isabel Garcia Tejerina.

## ANNEX

Els annexos I i II del Reglament tècnic de control i certificació de llavors de plantes farratgeres queden modificats de la manera següent:

1. L'annex I «Requisits de les llavors» es modifica de la manera següent:

a) S'afegeix el paràgraf següent al punt 1 de l'apartat A. Llavor certificada, després del text sobre *Pisum sativum* i *Vicia faba*:

«— *Trifolium subterraneum* i *Medicago* spp., excepte *M. lupulina*, *M. sativa* i *M. x varia*:

- Per a la producció de llavors de base: el 99,5%;
- Per a la producció de llavors certificades per a la seva reproducció: el 98%;
- Per a la producció de llavors certificades: el 95%.»

b) El quadre del punt 2 de l'apartat A. Llavor certificada de l'Annex I se substitueix pel següent:

QUADRE 2.A

Requisits de les llavors certificades

«Espècie	Germinació		Puresa analítica						Contingut màxim de llavors d'altres espècies de plantes (% en pes)					Contingut màxim de llavors d'altres espècies de plantes en una mostra del pes especificat a la columna 4 de l'annex III (total per columna)			Condicions pel que fa al contingut de llavors de <i>Lupinus</i> spp. d'un altre color o amargues
	Germinació mínima (% de llavors purses)	Contingut màxim de llavors durs (% de llavors purses)	Puresa analítica mínima (% en pes)	Total	Una sola espècie	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
																1	
	Poaceae (Gramineae)																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
<i>Agrostis canina</i>	75 (a)		90	2,0	1,0	0,3	0,3				0	0 (j) (k)	2 (n)				
<i>Agrostis capillaris</i>	75 (a)		90	2,0	1,0	0,3	0,3				0	0 (j) (k)	2 (n)				
<i>Agrostis gigantea</i>	80 (a)		90	2,0	1,0	0,3	0,3				0	0 (j) (k)	2 (n)				
<i>Agrostis stolonifera</i>	75 (a)		90	2,0	1,0	0,3	0,3				0	0 (j) (k)	2 (n)				
<i>Alopecurus pratensis</i>	70 (a)		75	2,5	1,0 (f)	0,3	0,3				0	0 (j) (k)	5 (n)				
<i>Arrhenatherum elatius</i>	75 (a)		90	3,0	1,0 (f)	0,5	0,3				0 (g)	0 (j) (k)	5 (n)				
<i>Cynodon dactylon</i>	70 (a)		90	2,0	1,0	0,3	0,3				0	0 (j) (k)	2				
<i>Dactylis glomerata</i>	80 (a)		90	1,5	1,0	0,3	0,3				0	0 (j) (k)	5 (n)				
<i>Festuca arundinacea</i>	80 (a)		95	1,5	1,0	0,5	0,3				0	0 (j) (k)	5 (n)				
<i>Festuca filiformis</i>	75 (a)		85	2,0	1,0	0,5	0,3				0	0 (j) (k)	5 (n)				
<i>Festuca ovina</i>	75 (a)		85	2,0	1,0	0,5	0,3				0	0 (j) (k)	5 (n)				
<i>Festuca pratensis</i>	80 (a)		95	1,5	1,0	0,5	0,3				0	0 (j) (k)	5 (n)				
<i>Festuca rubra</i>	75 (a)		90	1,5	1,0	0,5	0,3				0	0 (j) (k)	5 (n)				
<i>Festuca trachyphylla</i>	75 (a)		85	2,0	1,0	0,5	0,3				0	0 (j) (k)	5 (n)				
<i>x Festulolium</i>	75 (a)		96	1,5	1,0	0,5	0,3				0	0 (j) (k)	5 (n)				
<i>Lolium multiflorum</i>	75 (a)		96	1,5	1,0	0,5	0,3				0	0 (j) (k)	5 (n)				
<i>Lolium perenne</i>	80 (a)		96	1,5	1,0	0,5	0,3				0	0 (j) (k)	5 (n)				
<i>Lolium x hybridum</i>	75 (a)		96	1,5	1,0	0,5	0,3				0	0 (j) (k)	5 (n)				
<i>Phalaris aquatica</i>	75 (a)		96	1,5	1,0	0,3	0,3				0	0 (j) (k)	5				
<i>Phleum nodosum</i>	80 (a)		96	1,5	1,0	0,3	0,3				0	0 (k)	5				
<i>Phleum pratense</i>	80 (a)		96	1,5	1,0	0,3	0,3				0	0 (k)	5				
<i>Poa annua</i>	75 (a)		85	2,0 (c)	1,0 (c)	0,3	0,3				0	0 (j) (k)	5 (n)				
<i>Poa nemoralis</i>	75 (a)		85	2,0 (c)	1,0 (c)	0,3	0,3				0	0 (j) (k)	2 (n)				
<i>Poa palustris</i>	75 (a)		85	2,0 (c)	1,0 (c)	0,3	0,3				0	0 (j) (k)	2 (n)				
<i>Poa pratensis</i>	75 (a)		85	2,0 (c)	1,0 (c)	0,3	0,3				0	0 (j) (k)	2 (n)				
<i>Poa trivialis</i>	75 (a)		85	2,0 (c)	1,0 (c)	0,3	0,3				0	0 (j) (k)	2 (n)				
<i>Trisetum flavescens</i>	70 (a)		75	3,0	1,0 (f)	0,3	0,3				0 (h)	0 (j) (k)	2 (n)				

«Espècie	Germinació		Puresa analítica										Contingut màxim de llavors d'altres espècies de plantes en una mostra del pes especificat a la columna 4 de l'annex III (total per columna)			Condicions pel que fa al contingut de llavors de <i>Lupinus</i> spp. d'un altre color o amargues						
	Germinació mínima (% de llavors purses)	Contingut màxim de llavors durs (% de llavors purses)	Pureza analítica mínima (% en pes)	Contingut màxim de llavors d'altres espècies de plantes (% en pes)										Avena <i>fátua</i> i Avena <i>sterilis</i>	Cuscuta spp.		Rumex spp. <i>excepte Rumex acetosella</i> i Rumex <i>maritimus</i>					
				Total	Una sola espècie	<i>Elytrigia repens</i>	<i>Alopecurus myosuroides</i>	<i>Melilotus</i> spp.	<i>Raphanus raphanistrum</i>	<i>Sinapis arvensis</i>	11	10	9					8	7	6	5	4
<b>Fabaceae (Leguminosae)</b>																						
<i>Biserrula pelecinus</i>	70		98	0,5														0 (i)	0 (j) (k)	10		
<i>Galega orientalis</i>	60 (a) (b)	40	97	2,0	1,5			0,3										0	0 (l) (m)	10 (n)		
<i>Hedysarum coronarium</i>	75 (a) (b)	30	95	2,5	1,0			0,3										0	0 (k)	5		
<i>Lathyrus cicera</i>	80		95	1	0,5			0,3										0 (i)	0 (j) (k)	20		
<i>Lathyrus sativus</i>	80		95	1	0,5			0,3										0 (i)	0 (j) (k)	5		
<i>Lotus corniculatus</i>	75 (a) (b)	40	95	1,8 (d)	1,0 (d)			0,3										0	0 (l) (m)	10		
<i>Lupinus albus</i>	80 (a) (b)	20	98	0,5 (e)	0,3 (e)			0,3										0 (i)	0 (j)	5 (n)		o) (p)
<i>Lupinus angustifolius</i>	75 (a) (b)	20	98	0,5 (e)	0,3 (e)			0,3										0 (i)	0 (j)	5 (n)		o) (p)
<i>Lupinus luteus</i>	80 (a) (b)	20	98	0,5 (e)	0,3 (e)			0,3										0 (i)	0 (j)	5 (n)		o) (p)»
<i>Medicago dolia</i>	70		98	2														0 (i)	0 (j) (k)	10		
<i>Medicago italica</i>	70 (b)	20	98	2														0 (i)	0 (j) (k)	10		
<i>Medicago littoralis</i>	70		98	2														0 (i)	0 (j) (k)	10		
<i>Medicago lupulina</i>	80 (a) (b)	20	97	1,5	1,0			0,3										0	0 (l) (m)	10		
<i>Medicago murex</i>	70 (b)	30	98	2														0 (i)	0 (j) (k)	10		
<i>Medicago polymorpha</i>	70 (b)	30	98	2														0 (i)	0 (j) (k)	10		
<i>Medicago rugosa</i>	70 (b)	20	98	2														0 (i)	0 (j) (k)	10		
<i>Medicago sativa</i>	80 (a) (b)	40	97	1,5	1,0			0,3										0	0 (l) (m)	10		
<i>Medicago scutellata</i>	70		98	2														0 (i)	0 (j) (k)	10		
<i>Medicago truncatula</i>	70 (b)	20	98	2														0 (i)	0 (j) (k)	10		
<i>Medicago x varia</i>	80 (a) (b)	40	97	1,5	1,0			0,3										0	0 (l) (m)	10		
<i>Onobrychis vicifolia</i>	75 (a) (b)	20	95	2,5	1,0			0,3										0	0 (j)	5		
<i>Ornithopus compressus</i>	75		90	1														0 (i)	0 (j) (k)	10		
<i>Ornithopus sativus</i>	75		90	1														0 (i)	0 (j) (k)	10		
<i>Pisum sativum</i>	80 (a)		98	0,5	0,3			0,3										0	0 (j)	5 (n)		
<i>Trifolium alexandrinum</i>	80 (a) (b)	20	97	1,5	1,0			0,3										0	0 (l) (m)	10		
<i>Trifolium fragiferum</i>	70		98	1														0 (i)	0 (j) (k)	10		
<i>Trifolium glanduliferum</i>	70 (b)	30	98	1														0 (i)	0 (j) (k)	10		
<i>Trifolium hirtum</i>	70		98	1														0 (i)	0 (j) (k)	10		
<i>Trifolium hybridum</i>	80 (a) (b)	20	97	1,5	1,0			0,3										0	0 (l) (m)	10		
<i>Trifolium incarnatum</i>	75 (a) (b)	20	97	1,5	1,0			0,3										0	0 (l) (m)	10		
<i>Trifolium isthmocarpum</i>	70		98	1														0 (i)	0 (j) (k)	10		

«Espècie	Germinació		Puresa analítica										Contingut màxim de llavors d'altres espècies de plantes en una mostra del pes especificat a la columna 4 de l'annex III (total per columna)			Condicions pel que fa al contingut de llavors de <i>Lupinus</i> spp. d'un altre color o amargues	
	Germinació mínima (% de llavors purses)	Contingut màxim de llavors durs (% de llavors purses)	Pureza analítica mínima (% en pes)	Contingut màxim de llavors d'altres espècies de plantes (% en pes)										Avena fàtua i Avena sterilis	Cuscuta spp.		Rumex spp. excepte Rumex acetosella i Rumex maritimus
				Total	Una sola espècie	Elytrigia repens	Alopecurus myosuroides	Melilotus spp.	Raphanus raphanistrum	Sinapis arvensis							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
<i>Trifolium michelianum</i>	75 (b)	30	98	1								0 (i)	0 (j) (k)	10			
<i>Trifolium pratense</i>	80 (a) (b)	20	97	1,5	1,0			0,3			0	0 (l) (m)	10				
<i>Trifolium repens</i>	80 (a) (b)	40	97	1,5	1,0			0,3			0	0 (l) (m)	10				
<i>Trifolium resupinatum</i>	80 (a) (b)	20	97	1,5	1,0			0,3			0	0 (l) (m)	10				
<i>Trifolium squarrosum</i>	75 (b)	20	97	1,5				0,3			0	0 (l) (m)	10				
<i>Trifolium subterraneum</i>	80 (b)	40	97	0,5							0 (i)	0 (j) (k)	10				
<i>Trifolium vesiculosum</i>	70		98	1							0 (i)	0 (j) (k)	10				
<i>Trigonella foenum-graecum</i>	80 (a)		95	1,0	0,5			0,3			0	0 (j)	5				
<i>Vicia benghalensis</i>	80 (b)	20	97 (e)	1							0 (i)	0 (j) (k)	10				
<i>Vicia ervilia</i> (L.) Willd.	85 (b)	20	98	1 (e)	0,5			0,3			0 (i)	0 (j)	5				
<i>Vicia faba</i>	80 (a) (b)	5	98	0,5	0,3			0,3			0	0 (j)	5 (n)				
<i>Vicia monanthos</i> L. Desf.	85 (b)	20	98	1 (e)	0,5			0,3			0 (i)	0 (j) (k)	5 (n)				
<i>Vicia pannonica</i>	85 (a) (b)	20	98	1,0 (e)	0,5 (e)			0,3			0 (i)	0 (j)	5 (n)				
<i>Vicia sativa</i>	85 (a) (b)	20	98	1,0 (e)	0,5 (e)			0,3			0 (i)	0 (j)	5 (n)				
<i>Vicia villosa</i>	85 (a) (b)	20	98	1,0 (e)	0,5 (e)			0,3			0 (i)	0 (j)	5 (n)				
<b>Altres espècies</b>																	
<i>Brassica napus</i> var. napobrassica	80 (a)		98	1,0	0,5				0,3	0,3	0	0 (j) (k)	5				
<i>Brassica oleracea</i> convar. <i>acephala</i> (acephala var. medullosa + var. <i>viridis</i> )	75 (a)		98	1,0	0,5				0,3	0,3	0	0 (j) (k)	10				
<i>Plantago lanceolata</i>	75		85	1,5							0 (i)	0 (j) (k)	10				
<i>Raphanus sativus</i> var. <i>oleiformis</i>	80 (a)		97	1,0	0,5				0,3	0,3	0	0 (j)	5				

c) Les lletres e), i), j) i n) de les normes i condicions aplicables quan es fa referència al quadre 2.A sobre requisits de llavors certificades se substitueixen pel text següent:

«e) No es considera impuresa un contingut màxim total del 0,5% en pes de llavors de *Lupinus albus*, *Lupinus angustifolius*, *Lupinus luteus*, *Pisum sativum*, *Vicia faba* i *Vicia spp.* en una altra espècie corresponent.

i) El comptatge de les llavors d'*Avena fatua* i *Avena sterilis* no s'ha de fer a menys que hi hagi dubte que compleixin el que fixa la columna 12.

j) El comptatge de les llavors de cuscuta no s'ha de fer a menys que hi hagi dubte que compleixin el que fixa la columna 13.

n) El comptatge de les llavors d'altres *Rumex spp.* que no siguin *R. acetosella* i *R. maritimus* no s'ha de fer a menys que hi hagi dubte que compleixin el que fixa la columna 14.»

d) El quadre del punt 2 de l'apartat B. Llavors de base de l'annex I se substitueix pel següent:

## «QUADRE 2.B

## Requisits de les llavors de base

«Espècie	Contingut màxim de llavors d'altres espècies de plantes						Altres normes o condicions
	Total (% en pes)	Contingut en nombre en una mostra del pes especificat a la columna 4 de l'annex III (total per columna)					
		Una sola espècie	<i>Rumex spp. excepte Rumex acetosella i Rumex maritimus</i>	<i>Elytrigia repens</i>	<i>Alopecurus myosuroides</i>	<i>Melilotus spp.</i>	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Poaceae (Gramineae)</b>							
<i>Agrostis canina</i> . . . . .	0,3	20	1	1	1		(j)
<i>Agrostis capillaris</i> . . . . .	0,3	20	1	1	1		(j)
<i>Agrostis gigantea</i> . . . . .	0,3	20	1	1	1		(j)
<i>Agrostis stolonifera</i> . . . . .	0,3	20	1	1	1		(j)
<i>Alopecurus pratensis</i> . . . . .	0,3	20 (a)	2	5	5		(j)
<i>Arrhenatherum elatius</i> . . . . .	0,3	20 (a)	2	5	5		i) (j)
<i>Cynodon dactylon</i> . . . . .	0,3	20 (a)	1	1	1		(j)
<i>Dactylis glomerata</i> . . . . .	0,3	20 (a)	2	5	5		(j)
<i>Festuca arundinacea</i> . . . . .	0,3	20 (a)	2	5	5		(j)
<i>Festuca filiformis</i> . . . . .	0,3	20 (a)	2	5	5		(j)
<i>Festuca ovina</i> . . . . .	0,3	20 (a)	2	5	5		(j)
<i>Festuca pratensis</i> . . . . .	0,3	20 (a)	2	5	5		(j)
<i>Festuca rubra</i> . . . . .	0,3	20 (a)	2	5	5		(j)
<i>Festuca trachyphylla</i> . . . . .	0,3	20 (a)	2	5	5		(j)
<i>x Festulolium</i> . . . . .	0,3	20 (a)	2	5	5		(j)
<i>Lolium multiflorum</i> . . . . .	0,3	20 (a)	2	5	5		(j)
<i>Lolium perenne</i> . . . . .	0,3	20 (a)	2	5	5		(j)
<i>Lolium x hybridum</i> . . . . .	0,3	20 (a)	2	5	5		(j)
<i>Phalaris aquatica</i> . . . . .	0,3	20	2	5	5		(j)
<i>Phleum nodosum</i> . . . . .	0,3	20	2	1	1		(j)
<i>Phleum pratense</i> . . . . .	0,3	20	2	1	1		(j)

«Espècie	Contingut màxim de llavors d'altres espècies de plantes						Altres normes o condicions
	Total (% en pes)	Contingut en nombre en una mostra del pes especificat a la columna 4 de l'annex III (total per columna)					
		Una sola espècie	<i>Rumex</i> spp. excepte <i>Rumex acetosella</i> i <i>Rumex maritimus</i>	<i>Elytrigia repens</i>	<i>Alopecurus myosuroides</i>	<i>Melilotus</i> spp.	
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Poa annua</i> . . . . .	0,3	20 (b)	1	1	1		f) (j)
<i>Poa nemoralis</i> . . . . .	0,3	20 (b)	1	1	1		f) (j)
<i>Poa palustris</i> . . . . .	0,3	20 (b)	1	1	1		f) (j)
<i>Poa pratensis</i> . . . . .	0,3	20 (b)	1	1	1		f) (j)
<i>Poa trivialis</i> . . . . .	0,3	20 (b)	1	1	1		f) (j)
<i>Trisetum flavescens</i> . . . . .	0,3	20 (c)	1	1	1		i) (j)
<b>Fabaceae (Leguminosae)</b>							
<i>Biserrula pelecinus</i> . . . . .	0,3	20	5				
<i>Galega orientalis</i> . . . . .	0,3	20	2			0 (e)	(j)
<i>Hedysarum coronarium</i> . . . . .	0,3	20	2			0 (e)	(j)
<i>Lathyrus cicera</i> . . . . .	0,3	20	5	–	–	0 (d)	
<i>Lathyrus sativus</i> . . . . .	0,3	20	2	–	–	0 (d)	(h)
<i>Lotus corniculatus</i> . . . . .	0,3	20	3			0 (e)	g) (j)
<i>Lupinus albus</i> . . . . .	0,3	20	2			0 (d)	h) (k)
<i>Lupinus angustifolius</i> . . . . .	0,3	20	2			0 (d)	h) (k)
<i>Lupinus luteus</i> . . . . .	0,3	20	2			0 (d)	h) (k)
<i>Medicago doliata</i> . . . . .	0,3	20	5	–	–	0 (e)	
<i>Medicago italica</i> . . . . .	0,3	20	5	–	–	0 (e)	
<i>Medicago littoralis</i> . . . . .	0,3	20	5	–	–	0 (e)	
<i>Medicago lupulina</i> . . . . .	0,3	20	5	–	–	0 (e)	(j)
<i>Medicago murex</i> . . . . .	0,3	20	5	–	–	0 (e)	
<i>Medicago polymorpha</i> . . . . .	0,3	20	5	–	–	–	
<i>Medicago rugosa</i> . . . . .	0,3	20	5	–	–	–	
<i>Medicago sativa</i> . . . . .	0,3	20	3			0 (e)	(j)
<i>Medicago scutellata</i> . . . . .	0,3	20	5				
<i>Medicago truncatula</i> . . . . .	0,3	20	5				
<i>Medicago x varia</i> . . . . .	0,3	20	3			0 (e)	(j)
<i>Onobrychis viciifolia</i> . . . . .	0,3	20	2			0 (d)	
<i>Ornithopus compressus</i> . . . . .	0,3	20	5				
<i>Ornithopus sativus</i> . . . . .	0,3	20	5				
<i>Pisum sativum</i> . . . . .	0,3	20	2			0 (d)	
<i>Trifolium alexandrinum</i> . . . . .	0,3	20	3			0 (e)	(j)
<i>Trifolium fragiferum</i> . . . . .	0,3	20	5				
<i>Trifolium glanduliferum</i> . . . . .	0,3	20	5				
<i>Trifolium hirtum</i> . . . . .	0,3	20	5				
<i>Trifolium hybridum</i> . . . . .	0,3	20	3			0 (e)	(j)
<i>Trifolium incarnatum</i> . . . . .	0,3	20	3			0 (e)	(j)
<i>Trifolium isthmocarpum</i> . . . . .	0,3	20	5	–	–	–	(j)
<i>Trifolium michelianum</i> . . . . .	0,3	20	5	–	–	–	–
<i>Trifolium pratense</i> . . . . .	0,3	20	5			0 (e)	(j)
<i>Trifolium repens</i> . . . . .	0,3	20	5			0 (e)	(j)
<i>Trifolium resupinatum</i> . . . . .	0,3	20	3			0 (e)	(j)



«Espècie	Contingut màxim de llavors d'altres espècies de plantes						Altres normes o condicions
	Total (% en pes)	Contingut en nombre en una mostra del pes especificat a la columna 4 de l'annex III (total per columna)					
		Una sola espècie	<i>Rumex</i> spp. excepte <i>Rumex acetosella</i> i <i>Rumex maritimus</i>	<i>Elytrigia repens</i>	<i>Alopecurus myosuroides</i>	<i>Melilotus</i> spp.	
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Trifolium squarrosum</i> . . . . .	0,3	20	5	–	–	–	–
<i>Trifolium subterraneum</i> . . . . .	0,3	20	5	–	–	–	(j)
<i>Trifolium vesiculosum</i> . . . . .	0,3	20	5	–	–	–	(j)
<i>Trigonella foenum-graecum</i> . .	0,3	20	2			0 (d)	
<i>Vicia benghalensis</i> . . . . .	0,3	20	5	–	–	0 (d)	–
<i>Vicia ervilia</i> (L)Willd. . . . .	0,3	20	2			0 (d)	(h)
<i>Vicia faba</i> . . . . .	0,3	20	2			0 (d)	
<i>Vicia monanthos</i> L.Desf. . . . .	0,3	20	2			0 (d)	(h)
<i>Vicia pannonica</i> . . . . .	0,3	20	2			0 (d)	(h)
<i>Vicia sativa</i> . . . . .	0,3	20	2			0 (d)	(h)
<i>Vicia villosa</i> . . . . .	0,3	20	2			0 (d)	(h)
<b>Altres espècies</b>							
<i>Brassica napus</i> var. <i>napobrassica</i> . . . . .	0,3	20	2				(j)
<i>Brassica oleracea</i> convar. <i>acephala</i> (acephala var. <i>medullosa</i> + var. <i>viridis</i> ) . . . . .	0,3	20	3				(j)»
<i>Plantago lanceolata</i> . . . . .	0,3	20	3				
<i>Raphanus sativus</i> var. <i>oleiformis</i> . . . . .	0,3	20	2				

- d) Se substitueix l'apartat d) dels requisits de les llavors de base per la frase següent:
- «d) El comptatge de les llavors de *Melilotus* spp no s'ha de fer a menys que hi hagi dubte que es compleixi el que indica la columna 7.»
- e) El punt 7 de l'apartat C. Requisits de les llavors comercials de l'annex I se substitueix pel text següent:
- «7. Per a les espècies de *Vicia* no es considera impuresa un contingut màxim total del 6% en pes de llavors de *Vicia pannonica*, *Vicia villosa* i *Vicia benghalensis* o una espècie cultivada relacionada en una altra espècie pertinent.»
- f) El punt 8 de l'apartat C. Requisits de les llavors comercials de l'annex I se substitueix pel text següent:
- «8. Per a *Vicia pannonica*, *Vicia sativa*, *Vicia villosa* i *Vicia benghalensis* la puresa analítica mínima ha de ser del 97,0% en pes.»
- g) S'afegeix el punt 9 apartat C següent. Requisits de les llavors comercials de l'annex I:
- «9. Per a *Lathyrus cicera* la puresa analítica mínima ha de ser del 90% en pes. No es considera impuresa un contingut màxim total del 5% en pes de llavors d'espècies cultivades similars.»

2. L'annex II se substitueix pel text següent:

«ANNEX II

Pes dels lots i de les mostres

Espècie	Pes màxim d'un lot (en tones)	Pes mínim de la mostra que s'ha de prendre d'un lot (en grams)	Pes de la mostra per fer els comptatges que especifica l'annex I (en grams)
1	2	3	4
<b>Poaceae (Gramineae)</b>			
<i>Agrostis canina</i> . . . . .	10	50	5
<i>Agrostis capillaris</i> . . . . .	10	50	5
<i>Agrostis gigantea</i> . . . . .	10	50	5
<i>Agrostis stolonifera</i> . . . . .	10	50	5
<i>Alopecurus pratensis</i> . . . . .	10	100	30
<i>Arrhenatherum elatius</i> . . . . .	10	200	80
<i>Cynodon dactylon</i> . . . . .	10	50	5
<i>Dactylis glomerata</i> . . . . .	10	100	30
<i>Festuca arundinacea</i> . . . . .	10	100	50
<i>Festuca filiformis</i> . . . . .	10	100	30
<i>Festuca ovina</i> . . . . .	10	100	30
<i>Festuca pratensis</i> . . . . .	10	100	50
<i>Festuca rubra</i> . . . . .	10	100	30
<i>Festuca trachyphylla</i> . . . . .	10	100	30
<i>x Festulolium</i> . . . . .	10	200	60
<i>Lolium multiflorum</i> . . . . .	10	200	60
<i>Lolium perenne</i> . . . . .	10	200	60
<i>Lolium x hybridum</i> . . . . .	10	200	60
<i>Phalaris aquatica</i> . . . . .	10	100	50
<i>Phleum nodosum</i> . . . . .	10	50	10
<i>Phleum pratense</i> . . . . .	10	50	10
<i>Poa annua</i> . . . . .	10	50	10
<i>Poa nemoralis</i> . . . . .	10	50	5
<i>Poa palustris</i> . . . . .	10	50	5
<i>Poa pratensis</i> . . . . .	10	50	5
<i>Poa trivialis</i> . . . . .	10	50	5
<i>Trisetum flavescens</i> . . . . .	10	50	5
<b>Fabaceae (Leguminosae)</b>			
<i>Biserrula pelecinus</i> . . . . .	10	30	3
<i>Galega orientalis</i> . . . . .	10	250	200
<i>Hedysarum coronarium</i> . . . . .			
– Fruit . . . . .	10	1 000	300
– Llavor . . . . .	10	400	120
<i>Lathyrus cicera</i> . . . . .	25	1 000	140
<i>Lathyrus sativus</i> . . . . .	20	1 000	1 000
<i>Lotus corniculatus</i> . . . . .	10	200	30
<i>Lupinus albus</i> . . . . .	30	1 000	1 000
<i>Lupinus angustifolius</i> . . . . .	30	1 000	1 000
<i>Lupinus luteus</i> . . . . .	30	1 000	1 000
<i>Medicago doliaata</i> . . . . .	10	100	10
<i>Medicago italica</i> . . . . .	10	100	10

Espècie	Pes màxim d'un lot (en tones)	Pes mínim de la mostra que s'ha de prendre d'un lot (en grams)	Pes de la mostra per fer els comptatges que especifica l'annex I (en grams)
1	2	3	4
<i>Medicago littoralis</i> . . . . .	10	70	7
<i>Medicago lupulina</i> . . . . .	10	300	50
<i>Medicago murex</i> . . . . .	10	50	5
<i>Medicago polymorpha</i> . . . . .	10	70	7
<i>Medicago rugosa</i> . . . . .	10	180	18
<i>Medicago sativa</i> . . . . .	10	300	50
<i>Medicago scutellata</i> . . . . .	10	400	40
<i>Medicago truncatula</i> . . . . .	10	100	10
<i>Medicago x varia</i> . . . . .	10	300	50
<i>Onobrychis vicifolia</i> : . . . . .			
– Fruit . . . . .	10	600	600
– Llavor . . . . .	10	400	400
<i>Ornithopus compressus</i> . . . . .	10	120	12
<i>Ornithopus sativus</i> . . . . .	10	90	9
<i>Pisum sativum</i> . . . . .	30	1 000	1 000
<i>Trifolium alexandrinum</i> . . . . .	10	400	60
<i>Trifolium fragiferum</i> . . . . .	10	40	4
<i>Trifolium glanduliferum</i> . . . . .	10	20	2
<i>Trifolium hirtum</i> . . . . .	10	70	7
<i>Trifolium hybridum</i> . . . . .	10	200	20
<i>Trifolium incarnatum</i> . . . . .	10	500	80
<i>Trifolium isthmocarpum</i> . . . . .	10	100	3
<i>Trifolium michelianum</i> . . . . .	10	25	2
<i>Trifolium pratense</i> . . . . .	10	300	50
<i>Trifolium repens</i> . . . . .	10	200	20
<i>Trifolium resupinatum</i> . . . . .	10	200	20
<i>Trifolium squarrosus</i> . . . . .	10	150	15
<i>Trifolium subterraneum</i> . . . . .	10	250	25
<i>Trifolium vesiculosum</i> . . . . .	10	100	3
<i>Trigonella foenum-graecum</i> . . . . .	10	500	450
<i>Vicia benghalensis</i> . . . . .	20	1 000	120
<i>Vicia ervilia</i> (L)Willd. . . . .	20	1 000	1 000
<i>Vicia faba</i> . . . . .	30	1 000	1 000
<i>Vicia monanthos</i> L.Desf. . . . .	30	1 000	1 000
<i>Vicia pannonica</i> . . . . .	30	1 000	1 000
<i>Vicia sativa</i> . . . . .	30	1 000	1 000
<i>Vicia villosa</i> . . . . .	30	1 000	1 000
<b>Altres espècies</b>			
<i>Brassica napus</i> var. <i>napobrassica</i> . . . . .		200	100
<i>Brassica oleracea</i> convar. <i>acephala</i> . . . . .	10	200	100
<i>Plantago lanceolata</i> . . . . .	5	20	2
<i>Raphanus sativus</i> var. <i>oleiformis</i> . . . . .	10	300	300

En els pesos màxims dels lots, s'admet una tolerància de fins al 5 per 100.

(\*) El pes màxim de cada lot es pot augmentar a 25 tones si el proveïdor ha estat autoritzat a aquest efecte per l'autoritat competent de la comunitat autònoma responsable de la certificació d'aquestes llavors.»