

## I. DISPOSICIÓN XERAIS

### MINISTERIO DA PRESIDENCIA

**12183** *Corrección de erros do Real decreto 568/2011, do 20 de abril, polo que se modifica o Real decreto 258/1999, do 12 de febreiro, polo que se establecen condicións mínimas sobre a protección da saúde e a asistencia médica dos traballadores do mar.*

Advertidos erros nos anexos II e VI do Real decreto 568/2011, do 20 de abril, polo que se modifica o Real decreto 258/1999, do 12 de febreiro, polo que se establecen condicións mínimas sobre a protección da saúde e a asistencia médica dos traballadores do mar, publicado no «Boletín Oficial del Estado», suplemento en lingua galega número 114, do 13 de maio de 2011, procédese a efectuar as oportunas rectificacións:

No anexo II, páxina 7, Sección I - CAIXA DE PRIMEIROS AUXILIOS A, CAIXÓN 1: APARELLO CARDIOVASCULAR E ANTIHEMORRÁXICOS, columna PRESENTACIÓN correspondente ao CÓDIGO ATC C01DA, PRINCIPIO ACTIVO NITROGLICERINA, onde di: «20 draxeas de 1 mg», debe dicir: «30 comp. 0,8 mg».

No anexo II, páxina 8, CAIXÓN 2: APARELLO DIXESTIVO, columna PRESENTACIÓN correspondente ao CÓDIGO ATC A02AD, PRINCIPIO ACTIVO ALXELDRATO + HIDRÓXIDO DE MAGNESIO, onde di: «60 comp.: 600/300 mg respectivamente por comp.», debe dicir: «40 comp. 600/300 mg respectivamente por comp.». Na columna Cantidadade < 15 tripulantes correspondente ao mesmo código ATC, onde di: «2 caixas», debe dicir: «3 caixas». Na columna Cantidadade 15-20 tripulantes correspondente ao mesmo código ATC, onde di: «3 caixas», debe dicir: «4 caixas» e na columna Cantidadade >20 tripulantes, correspondente ao mesmo código ATC, onde di: «3 caixas», debe dicir: «4 caixas».

No anexo II, páxina 8, CAIXÓN 2: APARELLO DIXESTIVO, columna PRESENTACIÓN correspondente ao CÓDIGO ATC A03AX13, PRINCIPIO ACTIVO DIMETICONA, onde di: «30 comp. 40 mg», debe dicir: «20 draxeas 80 mg.»

No anexo II, páxina 8, CAIXÓN 3: ANALXÉSICOS, ANTIPIRÉTICOS, ANTIINFLAMATORIOS E ESPASMOLÍTICOS, columna PRESENTACIÓN correspondente ao CÓDIGO ATC A03BB, PRINCIPIO ACTIVO BUTILESCOPOLAMINA, BROMURO, onde di: «20 draxeas 10 mg», debe dicir: «60 comp.10 mg». Na columna Cantidadade 15-20 tripulantes, correspondente ao mesmo código ATC, onde di: «2 caixas», debe dicir: «1 caixa» e na columna Cantidadade >20 tripulantes, correspondente ao mesmo código ATC, onde di: «3 caixas», debe dicir: «1 caixa».

No anexo II, páxina 9, CAIXÓN 4: SISTEMA NERVIOSO, columna PRESENTACIÓN correspondente ao CÓDIGO ATC N05BA01, PRINCIPIO ACTIVO DIAZEPAM, debe incluírse unha fila na que figure o texto: «25 comp. 10 mg». Na columna Cantidadade <15 tripulantes, correspondente ao mesmo código ATC, principio activo e fila debe figurar o texto: «1 caixa». Na columna Cantidadade 15-20 tripulantes, correspondente ao mesmo código ATC, principio activo e fila debe figurar o texto: «1 caixa» e na columna Cantidadade >20 tripulantes correspondente ao mesmo código ATC, principio activo e fila, debe figurar o texto: «2 caixas».

No anexo II, páxina 10, CAIXÓN 7: OLLOS, OÍDOS, BOCA E GORXA, columna PRINCIPIOACTIVO correspondente ao CÓDIGOATC S01GA, onde di: «HIDROCLORURO FENILEFRINA+ÁCIDO BÓRICO + BORATO SÓDICO», debe dicir: «HIDROCLORURO FENILEFRINA» e na columna PRESENTACIÓN correspondente ao mesmo código ATC, onde di: «Colirio 10 ml, por 1 ml: ácido bórico 25 mg. Fenilef. Clor. 1,25 mg borato sódico 3 mg.», debe dicir: «Colirio 10 ml, 1,25 mg».

No anexo II, páxina 11, CAIXÓN 8: ANTIBIÓTICOS E ANTIINFECCIOSOS, columna PRESENTACIÓN correspondente ao CÓDIGO ATC P02CA01, PRINCIPIO ACTIVO

MEBENDAZOL, onde di: «8 comp. 100 mg», debe dicir: «6 comp. 100 mg», e na columna Cantidadade > 20 tripulantes correspondente ao mesmo código ATC, onde di: «3 caixas», debe dicir: «4 caixas».

No anexo II, páxina 11, CAIXÓN 8: ANTIBIÓTICOS E ANTIINFECCIOSOS, columna PRINCIPIO ACTIVO correspondente ao CÓDIGO ATC J06BB02, onde di: «GAMMAGLOBULINA ANTITETÁNICA», debe dicir: «GAMMAGLOBULINA ANTITETÁNICA \*\*\*».

No anexo II, páxina 12, CAIXÓN 11: MATERIAL DE EXAME MÉDICO E CONTROL DE UTILIZACIÓN DA CAIXA DE PRIMEIROS AUXILIOS, debe suprimirse a fila correspondente ao LIBRO DE REVISIÓN DA CAIXA DE PRIMEIROS AUXILIOS.

No anexo II, páxina 15, Sección II - CAIXA DE PRIMEIROS AUXILIOS B, CAIXÓN 1: APARELLO CARDIOVASCULAR E ANTIHEMORRÁXICOS, columna PRESENTACIÓN correspondente ao CÓDIGO ATC C01DA, PRINCIPIO ACTIVO NITROGLICERINA, onde di: «20 draxeas 1 mg», debe dicir: «30 comp. 0,8 mg».

No anexo II, páxina 16, CAIXÓN 2: APARELLO DIXESTIVO, columna CÓDIGO ATC correspondente ao PRINCIPIO ACTIVO ALXELDRATO + HIDRÓXIDO DE MAGNESIO, debe figurar o texto «A02AD». Así mesmo, na columna PRESENTACIÓN do dito principio activo, onde di: «60 comp.: 600/300 mg respectivamente por comp.», debe dicir: «40 comp.: 600/300 mg respectivamente por comp.» Na columna Cantidadade < 10 tripulantes correspondente ao mesmo código ATC, onde di: «2 caixas», debe dicir: «3 caixas» e na columna Cantidadade 10-15 tripulantes do mesmo código ATC, onde di: «3 caixas», debe dicir: «4 caixas».

No anexo II, páxina 16, CAIXÓN 2: APARELLO DIXESTIVO, columna PRESENTACIÓN correspondente ao CÓDIGO ATC A03AX13, PRINCIPIO ACTIVO DIMETICONA, onde di: «30 comp. 40 mg», debe dicir: «20 draxeas 80 mg».

No anexo II, páxina 16, CAIXÓN 3: ANALXÉSICOS, ANTIPIRÉTICOS, ANTIINFLAMATORIOS E ESPASMOLÍTICOS, columna PRESENTACIÓN correspondente ao CÓDIGO ATC A03BB, PRINCIPIO ACTIVO BUTILESCOPOLAMINA, BROMURO, onde di: «20 draxeas de 10 mg», debe dicir: «60 comp. 10 mg».

No anexo II, páxina 17, CAIXÓN 4: SISTEMA NERVIOSO, columna PRESENTACIÓN correspondente ao CÓDIGO ATC N05BA01, PRINCIPIO ACTIVO DIAZEPAM, debe incluírse unha fila na que figure o texto: «25 comp. 10 mg». Na columna Cantidadade <10 tripulantes, correspondente ao mesmo código ATC, principio activo e fila debe figurar o texto: «1 caixa». Na columna Cantidadade 10-15 tripulantes, correspondente ao mesmo código ATC, principio activo e fila debe figurar o texto: «1 caixa» e na columna Cantidadade >15 tripulantes, do mesmo código ATC, principio activo e fila, debe figurar o texto: «1 caixa».

No anexo II, páxina 19, CAIXÓN 8: ANTIBIÓTICOS E ANTIINFECCIOSOS, columna PRESENTACIÓN correspondente ao CÓDIGO ATC P02CA01, PRINCIPIO ACTIVO MEBENDAZOL, onde di: «8 comp. 100 mg», debe dicir: «6 comp. 100 mg».

No anexo II, páxina 19, CAIXÓN 8: ANTIBIÓTICOS E ANTIINFECCIOSOS, columna PRINCIPIO ACTIVO correspondente ao CÓDIGO ATC J06BB02, onde di: «GAMMAGLOBULINA ANTITETÁNICA», debe dicir: «GAMMAGLOBULINA ANTITETÁNICA \*\*».

No anexo II, páxina 20, CAIXÓN 11: MATERIAL DE EXAME MÉDICO E CONTROL DE UTILIZACIÓN DA CAIXA DE PRIMEIROS AUXILIOS, debe suprimirse a fila correspondente ao LIBRO DE REVISIÓN DA CAIXA DE PRIMEIROS AUXILIOS.

No anexo II, páxina 22, Sección III - CAIXA DE PRIMEIROS AUXILIOS C/BOTES SALVAVIDAS, columna PRESENTACIÓN correspondente ao CÓDIGO ATC C01DA, PRINCIPIO ACTIVO NITROGLICERINA, onde di: «20 draxeas 1 mg», debe dicir: «30 comp. 0,8 mg».

No anexo II, páxina 22, Sección III- CAIXA DE PRIMEIROS AUXILIOS C/BOTES SALVAVIDAS, columna PRESENTACIÓN correspondente ao CÓDIGO ATC A02AD, PRINCIPIO ACTIVO ALXELDRATO + HIDRÓXIDO DE MAGNESIO, onde di: «60 comp.600/300 mg respectivamente por comp.», debe dicir: «40 comp.600/300 mg

respectivamente por comp.»

No anexo II, páxina 22, Sección III- CAIXA DE PRIMEIROS AUXILIOS C/BOTES SALVAVIDAS, columna PRINCIPIO ACTIVO correspondente ao CÓDIGO ATC J06BB02, onde di: «GAMMAGLOBULINA ANTITETÁNICA \*», debe dicir: «GAMMAGLOBULINA ANTITETÁNICA \* \*\*\*». No pé de páxina debe figurar o texto: «(\*\*\*) Precisa conservación en neveira.»

No anexo II, páxina 23, columna MATERIAL MÉDICO, onde di: «FÉRULAS INCHABLES TRANSPARENTES. Xogo con varios tamaños \*\*», debe dicir: «FÉRULAS INCHABLES TRANSPARENTES. Xogo con varios tamaños \* \*\*».

No anexo II, páxina 24, Sección IV- CAIXA DE PRIMEIROS AUXILIOS BALSAS DE SALVAMENTO, columna PRESENTACIÓN correspondente ao CÓDIGO ATC C01DA, PRINCIPIO ACTIVO NITROGLICERINA, onde di: «20 draxeas 1 mg», debe dicir: «30 comp. 0,8 mg».

No anexo VI, páxina 28, 1.-BUQUES CATEGORÍA A, A) CONTROL DO CONTIDO DA CAIXA DE PRIMEIROS AUXILIOS TIPO A, Caixón 1: Aparello cardiovascular e antihemorráxicos, columna Presentación correspondente ao código ATC C01DA, principio activo NITROGLICERINA, onde di: «20 draxeas de 1 mg», debe dicir: «30 comp. 0,8 mg».

No anexo VI, páxina 29, caixón 2: aparello dixestivo, columna Presentación correspondente ao código ATC A02AD, principio activo ALXELDRATO + HIDRÓXIDO DE MAGNESIO, onde di: «60 comp. 600/300 mg», debe dicir: «40 comp. 600/300 mg». Na columna Cantidade exixida <15 tripulantes correspondente ao mesmo código ATC e Presentación, onde di: «2 caixas», debe dicir: «3 caixas». Na columna Cantidade exixida 15-20 tripulantes correspondente ao mesmo código ATC, onde di: «3 caixas», debe dicir: «4 caixas». Na columna Cantidade exixida > 20 tripulantes correspondente ao mesmo código ATC, onde di: «3 caixas», debe dicir: «4 caixas».

No anexo VI, páxina 29, caixón 2: aparello dixestivo, columna Presentación correspondente ao código ATC A03AX13, principio activo DIMETICONA, onde di: «30 comp. 40 mg», debe dicir: «20 draxeas 80 mg».

No anexo VI, páxina 30, caixón 3: analxésicos, antipiréticos, antiinflamatorios e espasmolíticos, columna Presentación correspondente ao código ATC A03BB, principio activo BUTILESCOPOLAMINA, BROMURO, onde di: «20 draxeas 10 mg», debe dicir: «60 comp.10 mg». Na columna Cantidade exixida 15-20 tripulantes correspondente ao mesmo código ATC e oresentación, onde di: «2 caixas», debe dicir: «1 caixa» e na columna Cantidade exixida >20 tripulantes correspondente ao mesmo código ATC, onde di: «3 caixas», debe dicir: «1 caixa».

No anexo VI, páxina 31, caixón 4: sistema nervioso, na columna presentación, correspondente ao código ATC N05BA01, principio activo DIAZEPAM, debe incluírse unha fila na que figure o texto: «25 comp. 10 mg». Na columna Cantidade exixida <15 tripulantes correspondente ao mesmo código ATC, principio activo e fila, debe figurar o texto: «1 caixa». Na columna Cantidade exixida 15-20 tripulantes correspondente ao mesmo código ATC, principio activo e fila debe figurar o texto: «1 caixa» e na columna Cantidade exixida >20 tripulantes correspondente ao mesmo código ATC, principio activo e fila, debe figurar o texto: «2 caixas».

No anexo VI, páxina 32, caixón 7: ollos, oídos, boca e gorxa, columna principio activo correspondente ao código ATC S01GA, onde di: «HIDROCLORURO FENILEFRINA+ACIDO BÓRICO + BORATO SÓDICO», debe dicir: «HIDROCLORURO FENILEFRINA» e na columna Presentación correspondente ao mesmo código ATC e principio activo, onde di: «Colirio 10 ml, por 1 ml: ácido bórico 25 mg. Fenilefrina clohidrato. 1,25 mg e borato sódico 3 mg», debe dicir: «Colirio 10 ml, 1,25 mg».

No anexo VI, páxina 33, caixón 8: antibióticos e antiifecciosos, columna Presentación correspondente ao código ATC P02CA01, principio activo MEBENDAZOL, onde di: «8 comp. 100 mg», debe dicir: «6 comp. 100 mg», e na columna Cantidade exixida > 20 tripulantes correspondente ao mesmo código ATC, onde di: «3 caixas», debe dicir: «4 caixas».

No anexo VI, páxina 33, caixón 8: antibióticos e antiifecciosos, columna principio

activo correspondente ao código ATC J06BB02, onde di: «GAMMAGLOBULINA ANTITETÁNICA», debe dicir: «GAMMAGLOBULINA ANTITETÁNICA \*\*\*».

No anexo VI, páxina 34, caixón 11: material de exame médico e control de utilización da caixa de primeiros auxilios, debe suprimirse a fila correspondente ao LIBRO DE REVISIÓN DA CAIXA DE PRIMEIROS AUXILIOS.

No anexo VI, páxina 42, 2.–BUQUES CATEGORÍA B, caixón 1: aparello cardiovascular e antihemorráxicos, columna Presentación correspondente ao código ATC C01DA, principio activo NITROGLICERINA, onde di: «20 draxeas 1 mg», debe dicir: «30 comp. 0,8 mg».

No anexo VI, páxina 43, caixón 2: aparello dixestivo, columna código ATC correspondente ao principio activo ALXELDRATO + HIDRÓXIDO DE MAGNESIO, debe figurar o texto: «A02AD». Así mesmo, na columna Presentación do dito principio activo, onde di: «60 comp.: 600/300 mg respectivamente por comp.», debe dicir: «40 comp.: 600/300 mg respectivamente por comp.» e na columna Cantidade exixida < 10 tripulantes correspondente ao mesmo código ATC e principio activo, onde di: «2 caixas», debe dicir: «3 caixas». Na columna Cantidade exixida 10-15 tripulantes correspondente ao mesmo código ATC e principio activo, onde di: «3 caixas», debe dicir: «4 caixas».

No anexo VI, páxina 43, caixón 2: aparello dixestivo, columna Presentación correspondente ao código ATC A03AX13, principio activo DIMETICONA, onde di: «30 comp. 40 mg», debe dicir: «20 draxeas 80 mg».

No anexo VI, páxina 43, caixón 3: analxésicos, antipiréticos, antiinflamatorios e espasmolíticos, columna Presentación correspondente ao código ATC A03BB, principio activo BUTILESCOPOLAMINA, BROMURO, onde di: «20 draxeas de 10 mg», debe dicir: «60 comp. 10 mg».

No anexo VI, páxina 44, caixón 4: sistema nervioso, columna Presentación correspondente ao código ATC N05BA01, principio activo DIAZEPAM, debe incluírse unha fila na que figure o texto: «25 comp. 10 mg». Na columna Cantidade exixida <10 tripulantes correspondente ao mesmo código ATC, principio activo e fila, debe figurar o texto: «1 caixa». Na columna Cantidade exixida 10-15 tripulantes correspondente ao mesmo código ATC, principio activo e fila, debe figurar o texto: «1 caixa» e na columna Cantidade exixida >15 tripulantes correspondente ao mesmo código ATC, principio activo e fila, debe figurar o texto: «1 caixa».

No anexo VI, páxina 46, caixón 8: antibióticos e antiifecciosos, columna Presentación correspondente ao código ATC P02CA01, principio activo MEBENDAZOL, onde di: «8 comp. 100 mg», debe dicir: «6 comp. 100 mg».

No anexo VI, páxina 46, caixón 8: antibióticos e antiifecciosos, columna principio activo correspondente ao código ATC J07AM01, onde di: «VACINA ANTITETÁNICA \*\*\*», debe dicir: «VACINA ANTITETÁNICA \*\*».

No anexo VI, páxina 46, caixón 8: antibióticos e antiifecciosos, columna principio activo correspondente ao código ATC J06BB02, onde di: «GAMMAGLOBULINA ANTITETÁNICA», debe dicir: «GAMMAGLOBULINA ANTITETÁNICA \*\*».

No anexo VI, páxina 46, caixón 8: antibióticos e antiifecciosos, columna principio activo correspondente ao código ATC P01BA01, onde di: «CLOROQUINA \*\*\*\*», debe dicir: «CLOROQUINA \*\*\*».

No anexo VI, páxina 46, caixón 8: antibióticos e antiifecciosos, columna principio activo correspondente ao código ATC P01BA, onde di: «QUININA\*\*\*\*», debe dicir: «QUININA\*\*\*».

No anexo VI, páxina 46, caixón 8: antibióticos e antiifecciosos, columna principio activo, onde di: «MEFLOQUINA\*\*\*\*», debe dicir: «MEFLOQUINA \*\*\*».

No anexo VI, páxina 46, caixón 8: antibióticos e antiifecciosos, columna principio activo correspondente ao código ATC P01AX06, onde di: «ATOVACUONA + PROGUANIL\*\*\*\*», debe dicir: «ATOVACUONA + PROGUANIL \*\*\*».

No anexo VI, páxina 48, caixón 11: material de exame médico e control de utilización da caixa de primeiros auxilios, debe suprimirse a fila correspondente ao LIBRO DE REVISIÓN DA CAIXA DE PRIMEIROS AUXILIOS.

No anexo VI, páxina 55, 3.-BUQUES CATEGORÍA C, columna Presentación correspondente ao código ATC C01DA, principio activo NITROGLICERINA, onde di: «20 draxeas 1 mg», debe dicir: «30 comp. 0,8 mg».

No anexo VI, páxina 55, columna Presentación correspondente ao código ATC A02AD, principio activo ALXELDRATO + HIDRÓXIDO DE MAGNESIO, onde di: «60 comp. 600/300 mg por comp.», debe dicir: «40 comp. 600/300 mg por comp.»

No anexo VI, páxina 55, columna principio activo correspondente ao código ATC J06BB02, onde di: «GAMMAGLOBULINA ANTITETÁNICA\*», debe dicir: «GAMMAGLOBULINA ANTITETÁNICA \* \*\*\*». No pé de páxina debe figurar o texto: «(\*\*\*) Precisa conservación en neveira».

No anexo VI, páxina 56, columna Material médico, onde di: «COLAR CERVICAL PARA INMOBILIZACIÓN. Talle grande. RÍXIDO o SEMI-RÍXIDO. \* \*\*», debe dicir: «COLAR CERVICAL PARA INMOBILIZACIÓN. Talle grande. RÍXIDO o SEMI-RÍXIDO. \*\*».

No anexo VI, páxina 59, 4.-BOTES SALVAVIDAS, medicamentos, columna Presentación correspondente ao código ATC C01DA, principio activo NITROGLICERINA, onde di: «20 draxeas 1 mg», debe dicir: «30 comp. 0,8 mg».

No anexo VI, páxina 59, 4.-BOTES SALVAVIDAS, medicamentos, columna Presentación correspondente ao código ATC A02AD, principio activo ALXELDRATO + HIDRÓXIDO DE MAGNESIO, onde di: «60 comp. 600/300 mg por comp.», debe dicir: «40 comp. 600/300 mg por comp.»